arXiv:1412.7986v2 [math.CA] 19 Mar 2015

О нижней априорной оценке минимального собственного значения одной задачи Штурма–Лиувилля с граничными условиями второго типа

А. А. Владимиров, Е. С. Карулина

Аннотация. Устанавливается достижимость точной нижней грани m_γ минимальных собственных значений граничных задач

$$-y'' + qy = \lambda y,$$
$$y'(0) = y'(1) = 0$$

при пробегании неотрицательным потенциалом $q \in L_1[0,1]$ единичной сферы пространства $L_\gamma[0,1]$, где $\gamma \in (0,1)$. Также устанавливается справедливость равенства $m_\gamma = 1$ при $\gamma \leqslant 1 - 2\pi^{-2}$, и неравенства $m_\gamma < 1$ иначе.

1. Введение. Рассмотрим задачу Штурма–Лиувилля

$$-y'' + qy = \lambda y, \tag{1.1}$$

$$y'(0) = y'(1) = 0, \tag{1.2}$$

где $y \in W_1^2[0,1]$, равенство (1.1) понимается в смысле обобщенного дифференцирования, а потенциал q пробегает множество

$$A_\gamma \rightleftharpoons \left\{ q \in L_1[0,1] \ : \ q(x) \overset{\text{п. в.}}{\geqslant} 0, \quad \int_0^1 q^\gamma \, dx = 1 \right\}.$$

Целью настоящей статьи является уточнение некоторых свойств точной нижней грани $m_\gamma \rightleftharpoons \inf_{q \in A_\gamma} \lambda_1(q)$ собственных значений задачи (1.1), (1.2) в случае $\gamma \in (0,1)$. А именно, нами будут установлены следующие два предложения:

1.1. *При всяком $\gamma \in (0,1)$ существует потенциал $q_* \in A_\gamma$, удовлетворяющий равенству $\lambda_1(q_*) = m_\gamma$.*

1.2. *При всяком $\gamma \in (0, 1 - 2\pi^{-2}]$ выполняется равенство $m_\gamma = 1$, а при всяком $\gamma \in (1 - 2\pi^{-2}, 1)$ выполняется неравенство $m_\gamma < 1$.*

Все рассматриваемые в тексте функциональные пространства предполагаются вещественными.

Отметим ряд известных в литературе результатов для оптимизационных проблем, подобных рассматриваемой нами. В работе [**1**] было исследовано при всех $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ поведение величины m_γ, отвечающей первой граничной задаче для уравнения

$$-y'' = \lambda q y. \tag{1.3}$$

[1]Работа первого автора поддержана РФФИ, проект № 13-01-00705. Работа обоих авторов поддержана РФФИ, проект № 14-01-31423, и РНФ, проект № 14-11-00754.

Та же проблема в случае второй и третьей граничных задач для уравнения (1.3) изучена в работе [**3**]. Случай первой граничной задачи для уравнения (1.1) рассмотрен в работе [**2**]. В тех же работах для рассматриваемых в них граничных задач изучено поведение не рассматриваемой нами величины $M_\gamma \rightleftharpoons \sup_{q\in A_\gamma} \lambda_1(q)$. Поведение последней при $\gamma \geqslant 1$ в первой граничной задаче для уравнения (1.1) рассматривалось также в работе [**6**], а при $\gamma = 1$ — в работе [**7**].

В случае $\gamma \geqslant 1$ рассматриваемая в настоящей статье задача изучалась, в частности, в работах [**4**], [**5**].

2. Переформулировка задачи. Далее мы всегда будем исходить из факта равносильности (см., например, [**5**]) граничной задачи (1.1), (1.2) спектральной задаче для операторного пучка $T_q\colon \mathbb{R} \to \mathcal{B}(W_2^1[0,1], W_2^{-1}[0,1])$ вида

$$\langle T_q(\lambda)y, y\rangle \equiv \int_0^1 \left[|y'|^2 + (q-\lambda)y^2\right] dx.$$

Введем в рассмотрение параметризованное значениями $\zeta > 0$ семейство множеств

$$M_\zeta \rightleftharpoons \{y \in W_2^1[0,1] \ : \ (\forall x \in [0,1]) \quad y(x) \geqslant \zeta\}.$$

При этом множество M всех равномерно положительных функций класса $W_2^1[0,1]$ очевидным образом допускает представление

$$M = \bigcup_{\zeta>0} M_\zeta.$$

Введем также в рассмотрение функционалы $J_\gamma\colon M \to \mathbb{R}$ и $G_\gamma\colon M \to \mathbb{R}$ вида

$$J_\gamma(y) \rightleftharpoons \int_0^1 (y')^2\, dx + \left(\int_0^1 y^{2\gamma/(\gamma-1)}\, dx\right)^{(\gamma-1)/\gamma},$$
$$G_\gamma(y) \rightleftharpoons J_\gamma(y)\cdot \|y\|^{-2}_{L_2[0,1]}.$$

Имеет место следующий факт:

2.1. *Справедливо равенство* $m_\gamma = \inf_{y\in M} G_\gamma(y)$.

Доказательство. Согласно неравенству Гельдера, для любых $q \in A_\gamma$ и $y \in M$ справедливы соотношения

$$1 = \left(\int_0^1 q^\gamma\, dx\right)^{1/\gamma} \leqslant \left[\left(\int_0^1 qy^2\, dx\right)^\gamma \cdot \left(\int_0^1 y^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}\, dx\right)^{1-\gamma}\right]^{1/\gamma},$$

влекущие независимо от выбора $\lambda \in \mathbb{R}$ оценку $\langle T_q(\lambda)y, y\rangle \geqslant J_\gamma(y) - \lambda\,\|y\|^2_{L_2[0,1]}$. Соответственно, зафиксировав (в согласии с теорией Штурма) в качестве $y \in M$ собственную функцию пучка T_q, отвечающую его наименьшему собственному значению $\lambda_1(q)$, устанавливаем справедливость соотношений

$$G_\gamma(y) \leqslant \langle T_q(\lambda_1(q))y, y\rangle \cdot \|y\|^{-2}_{L_2[0,1]} + \lambda_1(q) = \lambda_1(q).$$

Ввиду произвольности выбора потенциала $q \in A_\gamma$ это означает справедливость оценки $m_\gamma \geqslant \inf_{y\in M} G_\gamma(y)$.

Далее, при любом выборе функции $y \in M$ для потенциала

$$q_* \rightleftharpoons \left(\int_0^1 y^{2\gamma/(\gamma-1)}\, dx\right)^{-1/\gamma} \cdot y^{2/(\gamma-1)} \in A_\gamma$$

справедливы равенства $\langle T_{q_*}(G_\gamma(y))y, y\rangle = J_\gamma(y) - G_\gamma(y)\,\|y\|^2_{L_2[0,1]} = 0$, а тогда и оценка $\lambda_1(q_*) \leqslant G_\gamma(y)$. Произвольность выбора функции $y \in M$ означает потому справедливость оценки $m_\gamma \leqslant \inf_{y\in M} G_\gamma(y)$. □

3. Доказательство предложения 1.1. Имеет место следующий факт:

3.1. *Пусть $\varepsilon \in (0,1)$, и пусть $y \in M$ удовлетворяет неравенству*

$$G_\gamma(y) < (\pi^2/4)\cdot(1-\varepsilon)^2. \tag{3.1}$$

Тогда независимо от выбора точки $x \in [0,1]$ справедлива оценка

$$y(x) > \varepsilon\,\|y\|_{L_2[0,1]}. \tag{3.2}$$

Доказательство. Предположим, что некоторая точка $a \in [0,1]$ удовлетворяет неравенству $y(a) \leqslant \varepsilon\,\|y\|_{L_2[0,1]}$. Рассмотрим принадлежащие пространству $W^1_2[0,1]$ функции

$$y_-(x) \rightleftharpoons \begin{cases} y(x)-y(a) & \text{при } x \leqslant a,\\ 0 & \text{при } x \geqslant a,\end{cases} \qquad y_+(x) \rightleftharpoons \begin{cases} y(x)-y(a) & \text{при } x \geqslant a,\\ 0 & \text{при } x \leqslant a.\end{cases}$$

При этом очевидным образом справедливы оценки

$$\begin{aligned} \|y_-\|^2_{L_2[0,1]} + \|y_+\|^2_{L_2[0,1]} &= \|y-y(a)\|^2_{L_2[0,1]}\\ &\geqslant (1-\varepsilon)^2\,\|y\|^2_{L_2[0,1]}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

С другой стороны, справедливы также соотношения

$$\begin{aligned} J_\gamma(y) &\geqslant \int_0^1 (y'_-)^2\,dx + \int_0^1 (y'_+)^2\,dx\\ &\geqslant (\pi^2/4)\,\|y_-\|^2_{L_2[0,1]} + (\pi^2/4)\,\|y_+\|^2_{L_2[0,1]}, \end{aligned}$$

объединяя которые с (3.3), получаем оценку $G_\gamma(y) \geqslant (\pi^2/4)\cdot(1-\varepsilon)^2$. □

Обозначим символом Y множество функций $y \in M$, для которых неравенство (3.2) нарушается хотя бы в одной точке отрезка $[0,1]$. Введем также обозначение $\hat y$ для функции вида $\hat y(x) \equiv 1$. Предложение 3.1 гарантирует в случае $\varepsilon < 1/3$ справедливость оценок

$$m_\gamma \leqslant G_\gamma(\hat y) = 1 < (\pi^2/4)\cdot(1-\varepsilon)^2 \leqslant \inf_{y\in Y} G_\gamma(y),$$

а потому и соотношения $m_\gamma = \inf_{y\in M\setminus Y} G_\gamma(y)$. Незначительной модификацией этого факта является следующее предложение, в формулировке которого мы используем символ S для обозначения единичной сферы пространства $W^1_2[0,1]$:

3.2. *Существует значение $\zeta > 0$ со свойством $m_\gamma = \inf_{y\in M_\zeta\cap S} G_\gamma(y)$.*

Доказательство. Достаточно заметить, что всякая функция $y \in M\setminus Y$ со свойством $G_\gamma(y) < 3$ удовлетворяет оценкам

$$\|y\|^2_{W^1_2[0,1]} \leqslant [G_\gamma(y)+1]\cdot\|y\|^2_{L_2[0,1]} < 4\,\|y\|^2_{L_2[0,1]},$$

гарантирующим справедливость оценок $y(x) > (\varepsilon/2)\cdot\|y\|_{W^1_2[0,1]}$. □

Заметим теперь, что полная непрерывность вложения пространства $W^1_2[0,1]$ в пространство $L_2[0,1]$ гарантирует существование последовательности $\{y_n\}_{n=0}^\infty$ функций $y_n \in M_\zeta\cap S$, обладающей свойством $\lim_{n\to\infty} G_\gamma(y_n) = m_\gamma$ и сходящейся в пространстве $L_2[0,1]$ к

некоторой функции $y_* \in L_2[0,1]$. Рассмотрим соответствующую двойную последовательность $\{y_{n,m}\}_{(n,m)\in\mathbb{N}^2}$ функций вида

$$y_{n,m} \rightleftharpoons \frac{y_n + y_m}{2} \in M_\zeta.$$

С учетом неравенства Гельдера и теоремы Лагранжа о конечном приращении, указанные функции подчиняются оценкам

$$\left|\int_0^1 y_{n,m}^{2\gamma/(\gamma-1)}\,dx - \int_0^1 y_*^{2\gamma/(\gamma-1)}\,dx\right| \leqslant \frac{2\gamma\cdot\zeta^{(\gamma+1)/(\gamma-1)}}{1-\gamma}\cdot\|y_{n,m}-y_*\|_{L_2[0,1]}.$$

Соответственно, справедливы также соотношения

$$\begin{aligned}
\liminf_{n,m\to\infty} G_\gamma(y_{n,m}) &= \frac{\liminf\limits_{n,m\to\infty}\|y_{n,m}\|^2_{W_2^1[0,1]} - \|y_*\|^2_{L_2[0,1]} + \left(\int_0^1 y_*^{2\gamma/(\gamma-1)}\,dx\right)^{(\gamma-1)/\gamma}}{\|y_*\|^2_{L_2[0,1]}}\\
&\leqslant \frac{1-\|y_*\|^2_{L_2[0,1]} + \left(\int_0^1 y_*^{2\gamma/(\gamma-1)}\,dx\right)^{(\gamma-1)/\gamma}}{\|y_*\|^2_{L_2[0,1]}}\\
&= \lim_{n\to\infty} G_\gamma(y_n)\\
&= m_\gamma,
\end{aligned}$$

вместе с тривиальной оценкой $\liminf_{n,m\to\infty} G_\gamma(y_{n,m}) \geqslant m_\gamma$ означающие выполнение равенства $\lim_{n,m\to\infty}\|y_{n,m}\|_{W_2^1[0,1]} = 1$. Из факта равномерной выпуклости гильбертова пространства $W_2^1[0,1]$ теперь немедленно вытекает, что последовательность $\{y_n\}_{n=0}^\infty$ фундаментальна в пространстве $W_2^1[0,1]$. Тем самым, предельная функция $y_* \in L_2[0,1]$ в действительности принадлежит классу $M_\zeta \cap S$ и удовлетворяет равенству $G_\gamma(y_*) = m_\gamma$.

Итак, нами установлено существование функции $y_* \in M$, на которой достигается минимальное по классу M значение функционала G_γ. Это автоматически означает обращение в нуль дифференциала $DG_\gamma(y_*)$, что, в свою очередь, равносильно выполнению равенства $T_{q_*}(m_\gamma)y_* = 0$, где положено

$$q_* \rightleftharpoons \left(\int_0^1 y_*^{2\gamma/(\gamma-1)}\,dx\right)^{-1/\gamma}\cdot y_*^{2/(\gamma-1)} \in A_\gamma.$$

Доказательство предложения 1.1 тем самым завершено.

4. Доказательство предложения 1.2. Начнем с установления справедливости второй части рассматриваемого предложения:

4.1. *При любом $\gamma \in (1-2\pi^{-2}, 1)$ выполняется неравенство $m_\gamma < 1$.*

Доказательство. Достаточно установить, что функция $\hat{y} \in M$ вида $\hat{y}(x) \equiv 1$ не является минимумом функционала G_γ. Это заведомо имеет место, когда квадратичная форма второго дифференциала функционала G_γ в точке $\hat{y}$ не является неотрицательно определенной. Для доказательства последнего, ввиду легко проверяемых тождеств

$$\begin{aligned}
DG_\gamma(y;\,v) \equiv \frac{2}{\|y\|^2_{L_2[0,1]}}\cdot\Bigg[&\int_0^1 y'v'\,dx +\\
&+\left(\int_0^1 y^{2\gamma/(\gamma-1)}\,dx\right)^{-1/\gamma}\cdot\int_0^1 y^{(\gamma+1)/(\gamma-1)}v\,dx - G_\gamma(y)\cdot\int_0^1 yv\,dx\Bigg],
\end{aligned}$$

$$D^2G_\gamma(\hat y;\,u,v)\equiv\int_0^1 2u'v'\,dx+\frac{4}{1-\gamma}\,\left(\int_0^1 u\,dx\cdot\int_0^1 v\,dx-\int_0^1 uv\,dx\right),$$

достаточно установить отрицательность наименьшего собственного значения граничной задачи

$$-y''+\frac{2}{1-\gamma}\,\left(\int_0^1 y\,dx-y\right)=\lambda y,$$
$$y'(0)=y'(1)=0.$$

Однако это собственное значение есть $\pi^2-2\,(1-\gamma)^{-1}<0$. □

При доказательстве первой части предложения 1.2 мы будем опираться на следующий факт:

4.2. *Функция $\gamma\mapsto m_\gamma$ невозрастает на множестве $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.*

Доказательство. Зафиксируем произвольную равномерно положительную функцию $q\in C[0,1]$. С учетом неравенства Гельдера, при любом выборе значений $\gamma>0$ и $\beta>1$ справедливы оценки

$$\left(\int_0^1 q^\gamma\,dx\right)^{1/\gamma}=\left[\left(\int_0^1 q^{\beta\cdot(\gamma/\beta)}\,dx\right)^{1/\beta}\right]^{\beta/\gamma}\geqslant\left(\int_0^1 q^{\gamma/\beta}\,dx\right)^{\beta/\gamma},$$

а при любом выборе значений $\gamma<0$ и $\beta>1$ справедливы оценки

$$\left(\int_0^1 q^\gamma\,dx\right)^{1/\gamma}=\left[\left(\int_0^1 q^{\beta\cdot(\gamma/\beta)}\,dx\right)^{1/\beta}\right]^{\beta/\gamma}\leqslant\left(\int_0^1 q^{\gamma/\beta}\,dx\right)^{\beta/\gamma}.$$

Вместе с легко проверяемым асимптотическим соотношением

$$\lim_{\gamma\to0}\left(\int_0^1 q^\gamma\,dx\right)^{1/\gamma}=\exp\left(\int_0^1\ln q\,dx\right)$$

это означает неубывание функции $\gamma\mapsto\left(\int_0^1 q^\gamma\,dx\right)^{1/\gamma}$ на множестве $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Соответственно, независимо от выбора значений $\gamma,\gamma_1\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ со свойством $\gamma_1>\gamma$ для любой функции $q\in A_\gamma\cap C[0,1]$ найдется величина $C\in(0,1]$ со свойством $Cq\in A_{\gamma_1}$. Учет тривиальных оценок $\lambda_1(Cq)\leqslant\lambda_1(q)$ и факта плотности подмножества $A_\gamma\cap C[0,1]$ в множестве $A_\gamma\subset L_1[0,1]$ завершает доказательство. □

Предложение 4.2 вместе с выполняющимся независимо от выбора $\gamma\in(0,1)$ для функции $\hat y\in M$ вида $\hat y(x)\equiv1$ равенством $G_\gamma(\hat y)=1$ показывают, что справедливость предложения 1.2 достаточно проверить в случае $\gamma=1-2\pi^{-2}$. Выполнение последнего равенства и будет предполагаться в оставшейся части статьи.

Введем в рассмотрение параметризованное величиной $\alpha>0$ семейство функций

$$f_\alpha(t)\rightleftharpoons\alpha t^{2\gamma}-t^2-1,\qquad t\in(0,+\infty).\tag{4.1}$$

Имеет место следующий факт:

4.3. *Множество точек $t \in \mathbb{R}$ со свойством $f_\alpha(t) > 0$ непусто в точности при выполнении условия*

$$\alpha > \gamma^{-\gamma}\,(1-\gamma)^{\gamma-1} \tag{4.2}$$

и представляет собой в этом случае некоторый интервал $(\omega_\alpha^-, \omega_\alpha^+)$.

Доказательство. При любом значении параметра $\alpha > 0$ справедливо тождество

$$f'_\alpha(t) \equiv 2\alpha\gamma t^{2\gamma-1} - 2t, \tag{4.3}$$

означающее, что функция f_α строго возрастает слева от точки $\tau_\alpha \rightleftharpoons (\alpha\gamma)^{\frac{1}{2-2\gamma}}$ и строго убывает справа от нее. Соответственно, область положительности функции f_α непуста в точности при выполнении условия $f_\alpha(\tau_\alpha) > 0$, равносильного условию (4.2), и представляет собой в этом случае содержащий точку τ_α интервал. □

Кроме тождества (4.3), нами далее будут использоваться также тождества

$$f''_\alpha(t) \equiv 2\alpha\gamma\,(2\gamma-1)t^{2\gamma-2} - 2, \tag{4.4}$$

$$f'''_\alpha(t) \equiv 2\alpha\gamma(2\gamma-1)(2\gamma-2)\,t^{2\gamma-3}. \tag{4.5}$$

Предложение 1.1 показывает, что граничная задача

$$\begin{gathered} -y'' + y^{(\gamma+1)/(\gamma-1)} = \mu y, \\ y'(0) = y'(1) = 0, \\ \int_0^1 y^{2\gamma/(\gamma-1)}\,dx = 1 \end{gathered} \tag{4.6}$$

не может оказаться неразрешимой в случае $\mu = m_\gamma$. Непосредственно проверяется также, что в случае $\mu < 1$ соответствующее решение не может быть постоянным. Тем самым, для завершения доказательства предложения 1.2 достаточно установить, что период непостоянных решений уравнения (4.6) не может быть равен 2 при выполнении неравенства $\mu < 1$. Поскольку, как показывают стандартные вычисления, этот период представляет собой величину $2\mu^{-1/2}\,(1-\gamma)\,I_0(\hat\alpha)$, где положено

$$I_\varepsilon(\alpha) \rightleftharpoons \int_{\omega_\alpha^-+\varepsilon}^{\omega_\alpha^+-\varepsilon} \frac{dt}{\sqrt{f_\alpha(t)}}, \qquad \varepsilon \geqslant 0,$$

$$\hat\alpha \rightleftharpoons \left(\frac{\gamma}{1-\gamma}\right)^{1-\gamma} \cdot \mu^{-\gamma} \cdot \left[(y')^2 + \mu y^2 + \frac{1-\gamma}{\gamma}\,y^{2\gamma/(\gamma-1)}\right],$$

то поставленная цель будет достигнута установлением справедливости следующего предложения:

4.4. *Функция I_0 не может принимать значения, меньшие величины $(1-\gamma)^{-1}$.*

Доказательство. Введем обозначения

$$A_\alpha(t) \rightleftharpoons t^{2\gamma} f'_\alpha(t) - 4\gamma t^{2\gamma-1} f_\alpha(t), \tag{4.7}$$

$$\psi_\alpha \rightleftharpoons (f'_\alpha)^2 - 2 f_\alpha f''_\alpha. \tag{4.8}$$

Из тождества (4.5) следует, что при любой фиксации значения $\alpha_0 > \gamma^{-\gamma}\,(1-\gamma)^{\gamma-1}$ функция ψ_{α_0} монотонна на интервале $(\omega_{\alpha_0}^-, \omega_{\alpha_0}^+)$. Отсюда и из обусловленных тождеством (4.3) неравенств $f'_{\alpha_0}(\omega_{\alpha_0}^\pm) \neq 0$ вытекает также равномерная положительность функции ψ_{α_0} на указанном интервале.

Дифференцируя с учетом последнего факта функции I_ε при $\varepsilon > 0$ на малой окрестности $U \ni \alpha_0$, устанавливаем справедливость соотношений

$$
\begin{aligned}
I'_\varepsilon(\alpha) &\equiv -\int_{\omega_\alpha^- + \varepsilon}^{\omega_\alpha^+ - \varepsilon} \frac{t^{2\gamma}\,dt}{2f_\alpha^{3/2}(t)} - \frac{(\omega_\alpha^+)^{2\gamma}}{f'_\alpha(\omega_\alpha^+)\sqrt{f_\alpha(\omega_\alpha^+ - \varepsilon)}} + \frac{(\omega_\alpha^-)^{2\gamma}}{f'_\alpha(\omega_\alpha^-)\sqrt{f_\alpha(\omega_\alpha^- + \varepsilon)}} \\
&= -\int_{\omega_\alpha^- + \varepsilon}^{\omega_\alpha^+ - \varepsilon} \frac{t^{2\gamma}\,dt}{2f_\alpha^{3/2}(t)} - \frac{A_\alpha(t)}{\psi_\alpha(t)\sqrt{f_\alpha(t)}}\Bigg|_{\omega_\alpha^- + \varepsilon}^{\omega_\alpha^+ - \varepsilon} + O(\varepsilon^{1/2}) \\
&= -\int_{\omega_\alpha^- + \varepsilon}^{\omega_\alpha^+ - \varepsilon} \left[\frac{t^{2\gamma}}{2f_\alpha^{3/2}(t)} + \left(\frac{A_\alpha(t)}{\psi_\alpha(t)\sqrt{f_\alpha(t)}}\right)'\right] dt + O(\varepsilon^{1/2}),
\end{aligned}
$$

где асимптотические оценки остаточных слагаемых равномерны по окрестности U. Соответственно, функция I_0 также дифференцируема на U и имеет производную

$$
\begin{aligned}
I'_0(\alpha) &\equiv -\int_{\omega_\alpha^-}^{\omega_\alpha^+} \left[\frac{t^{2\gamma}}{2f_\alpha^{3/2}(t)} + \left(\frac{A_\alpha(t)}{\psi_\alpha(t)\sqrt{f_\alpha(t)}}\right)'\right] dt \\
&= -\int_{\omega_\alpha^-}^{\omega_\alpha^+} \frac{1}{\psi_\alpha^2(t)\sqrt{f_\alpha(t)}} \cdot \left[\frac{t^{2\gamma}\psi_\alpha^2(t)}{2f_\alpha(t)} + \right. \\
&\qquad \left. + \left(A'_\alpha(t) - \frac{A_\alpha(t)f'_\alpha(t)}{2f_\alpha(t)}\right) \cdot \psi_\alpha(t) - A_\alpha(t)\psi'_\alpha(t)\right] dt \\
&= -\int_{\omega_\alpha^-}^{\omega_\alpha^+} \frac{1}{\psi_\alpha^2(t)\sqrt{f_\alpha(t)}} \cdot \left[\frac{t^{2\gamma}\psi_\alpha^2(t)}{2f_\alpha(t)} - \right. \\
&\qquad \left. - \left(\frac{t^{2\gamma}\psi_\alpha(t)}{2f_\alpha(t)} + 4\gamma\,(2\gamma-1)t^{2\gamma-2}f_\alpha(t)\right) \cdot \psi_\alpha(t) - A_\alpha(t)\psi'_\alpha(t)\right] dt \\
&= \int_{\omega_\alpha^-}^{\omega_\alpha^+} \frac{1}{\psi_\alpha^2(t)\sqrt{f_\alpha(t)}} \cdot \left[4\gamma\,(2\gamma-1)t^{2\gamma-2}f_\alpha(t) \cdot [(f'_\alpha(t))^2 - 2f_\alpha(t)f''_\alpha(t)] - \right. \\
&\qquad \left. - 2f_\alpha(t)f'''_\alpha(t) \cdot [t^{2\gamma}f'_\alpha(t) - 4\gamma t^{2\gamma-1}f_\alpha(t)]\right] dt \\
&= \int_{\omega_\alpha^-}^{\omega_\alpha^+} \frac{8\gamma\,(2\gamma-1)t^{2\gamma-3}f_\alpha(t)f'_\alpha(t)}{\psi_\alpha^2(t)\sqrt{f_\alpha(t)}}\,dt \\
&= \int_{\omega_\alpha^-}^{\tau_\alpha} \frac{16\gamma\,(2\gamma-1)t^{2\gamma-3}}{3\psi_\alpha^2(t)}\,d(f_\alpha^{3/2}) + \int_{\tau_\alpha}^{\omega_\alpha^+} \frac{16\gamma\,(2\gamma-1)t^{2\gamma-3}}{3\psi_\alpha^2(t)}\,d(f_\alpha^{3/2}).
\end{aligned}
$$

С учетом обусловленного (4.8) и (4.5) убывания функции $t \mapsto t^{2\gamma-3}\psi_{\alpha_0}^{-2}(t)$, это гарантирует справедливость неравенства $I'_0(\alpha_0) > 0$. Произвольность выбора точки $\alpha_0 > \gamma^{-\gamma}\,(1-\gamma)^{\gamma-1}$ означает потому строгое возрастание функции I_0 на всей ее области определения. С другой стороны, при $\alpha \to \gamma^{-\gamma}\,(1-\gamma)^{\gamma-1} + 0$ имеют место асимптотические соотношения

$$
\begin{aligned}
I_0(\alpha) &= \int_{\omega_\alpha^-}^{\omega_\alpha^+} \frac{d(f'_\alpha)}{f''_\alpha\sqrt{f_\alpha}} \\
&= \frac{1+o(1)}{2\sqrt{1-\gamma}} \cdot \left[\int_{\tau_\alpha}^{\omega_\alpha^-} \frac{\sqrt{2}\,d(f'_\alpha)}{\sqrt{[f'_\alpha(\omega_\alpha^-)]^2 - [f'_\alpha]^2}} + \int_{\omega_\alpha^+}^{\tau_\alpha} \frac{\sqrt{2}\,d(f'_\alpha)}{\sqrt{[f'_\alpha(\omega_\alpha^+)]^2 - [f'_\alpha]^2}}\right]
\end{aligned}
$$

$$= \frac{1+o(1)}{\sqrt{1-\gamma}} \cdot \int_0^1 \frac{\sqrt{2}\,dt}{\sqrt{1-t^2}}$$
$$= \frac{\pi}{\sqrt{2\cdot(1-\gamma)}} + o(1)$$
$$= (1-\gamma)^{-1} + o(1).$$

Тем самым, доказываемое утверждение справедливо. □

Доказательство предложения 1.2 завершено. В заключение отметим, что приведенное доказательство предложения 4.4 основано на идее доказательства основной леммы работы [**8**].

Список литературы

[1] Ю. В. Егоров, В. А. Кондратьев, *Об оценках первого собственного значения в некоторых задачах Штурма–Лиувилля* // Успехи матем. наук. — 1996. — Т. 51, № 3. — С. 73–144.

[2] С. С. Ежак, *Об оценках минимального собственного значения задачи Штурма–Лиувилля с интегральным условием* // Соврем. матем. и ее прилож. — 2007 — Т. 36. — С. 56–69.

[3] О. В. Мурышкина, *Об оценках минимального собственного значения задачи Штурма–Лиувилля с несимметричными краевыми условиями* // Дифференц. уравнения. — 2001. Т. 37, № 6. – С. 854.

[4] Е. С. Карулина, *Оценки первого собственного значения задачи Штурма–Лиувилля с краевыми условиями третьего типа* / Качественные свойства решений дифференциальных уравнений и смежные вопросы спектрального анализа. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 560–607.

[5] E. S. Karulina, A. A. Vladimirov, *The Sturm–Liouville problem with singular potential and the extremaof the first eigenvalue* // Tatra Mountains Mathematical Publications. — 2013. — V. 54. — P. 101–118.

[6] В. А. Винокуров, В. А. Садовничий, *О границах изменения собственного значения при изменении потенциала* // Доклады РАН. — 2003. — Т. 392, № 5. — С. 592–597.

[7] Ю. В. Егоров, В. А. Кондратьев, *Об оценках первого собственного значения задачи Штурма–Лиувилля* // Успехи матем. наук. — 1984. — Т. 39, № 2. — С. 151–152.

[8] А. И. Назаров, *О точных константах в одномерных теоремах вложения произвольного порядка* / Проблемы современной теории приближений. СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. С. 146–158.